

REVISION DE PEP EN LA USM DE TOMELLOSO AÑO 2018

AUTORES: SERRANO CARAÑANA MN, DÍAZ FERNANDEZ MC, GUIJARRO LUÍS, INFANTE SANCHEZ-DE LUGAR NUEVO M, LÓPEZ CANOVAS FJ

Introducción

¿Por Qué es Importante la Intervención Precoz en los PEPs?

En España hay 440.000 enfermos de esquizofrenia u otras psicosis relacionadas (prevalencia-vida de 1 caso por cada 100 habitantes), con una incidencia de esquizofrenia para la edad de riesgo de 15-54 años de 1,9/10.000 habitantes por año . Sólo el 50% recibe tratamiento (Sadock BJ, Sadock VA, 2003)









OBJETIVOS:

Revisar la incidencia de primeros episodios psicóticos en la Unidad de salud mental de Tomelloso, con una población de 60.000 habitantes, distribución por sexos, diagnostico al año del PEP, puerta de entrada, relación con tóxicos, tratamientos aplicados, y la situación ocupacional de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión de la Historia clínica informatizada de Salud Mental de adultos, donde registramos el proceso asistencial integrado de primeros episodios psicóticos, además de fuentes digitalizadas de la HC antigua, y visor clínico para comprobar asistencia previa en otras unidades . Durante el año 2018 hemos tenido 12 Primeros episodios psicóticos en la Unidad de Salud mental de Tomelloso.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

La edad de presentación del primer episodio psicótico, tiene una gran relevancia, pues incide en la etapa en que esta población inicia sus primeros trabajos, estabiliza relaciones interpersonales, inicia estudios universitarios, etc. Es por ello, que una intervención temprana puede mitigar este gran impacto con una continuidad asistencial adecuada, para prevenir recaídas, tratarlas y poder reintegrar al paciente lo antes posible .