


Concordancia en el diagnóstico entre atención primaria y salud mental.

Martinez de Hoyos C, Blanco Prieto M.
Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Madrid.


Introducción: Atención primaria constituye la puerta de entrada de la gran mayoría de pacientes con alteraciones psiquiátricas, con una prevalencia alrededor de un 30-40 % en estas consultas. En un 10-15 % de los casos acaban siendo derivados a las consultas de salud mental. En ocasiones, podemos comprobar la discordancia entre los diagnósticos de los médicos de atención primaria y los psiquiatras.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los pacientes de un CAP, que fueron derivados a una primera cita de evaluación de psiquiatría. Se recogieron los datos sociodemográficos y las variables en cuanto al diagnóstico realizado por los MAP, así como el realizado por el psiquiatra consultor, de todos los pacientes derivados durante un año.

DIAGNÓSTICOS POR MAP



DIAGNÓSTICOS POR PSIQUIATRA CONSULTOR



Resultados: Los resultados obtenidos nos indican una mayor tasa de concordancia entre las patologías más graves, psicosis, trastorno bipolar. Las tasas más altas de discordancia se encontraron entre los diagnósticos de depresión, ansiedad realizados por los médicos de atención primaria, y que eran modificados en muchos casos por trastornos adaptativos por el psiquiatra.

Bibliografía:

Landa González N, Goñi Sarries A, García de Jalón Aramayo E, Lizasoain Urra E. Concordancia en el diagnóstico entre atención primaria y salud mental. Aten Primaria 2008;40(6): 285-9.

Herrán A, López-Lanza JR, Ganzo H, Vázquez-Barquero JL. Derivación de los pacientes con enfermedad mental desde Atención Primaria a Salud Mental. Actas Esp Psiquiatr. 2000;28:13-21.