

Análisis prospectivo de las diferencias psicológicas entre adultos y pacientes de cáncer de edad avanzada durante la quimioterapia adyuvante postoperatoria

Marta Oporto ¹, Marina Fernández ¹, Caterina Calderón ², Oliver Higuera ³, Margarita Majem ⁴ y Paula Jiménez-Fonseca ⁵

Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona (España) 1; Dpto. Clínica y Psicobiología. Universidad de Barcelona (España) 2; Hospital Universitario La Paz, Madrid (España) 3; Hospital Universitario Santa Creu y Sant Pau, Barcelona (España) 4; Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (España) 5.

Introducción:

Se ha encontrado que la edad podría ser un factor diferenciador en el malestar psicológico en pacientes con cáncer.

Objetivos:

El objetivo de este estudio es describir las diferencias en las características psicológicas entre los pacientes de cáncer de edad avanzada y adultos y examinar las diferencias en su evolución psicológica durante la quimioterapia adyuvante.

Método:

Se reclutaron 394 adultos (18 – 69 años) y 106 pacientes de edad avanzada (≥ 70) con cáncer resecado no metastásico recién diagnosticado admitidos para recibir quimioterapia adyuvante. Los pacientes completaron los siguientes cuestionarios: Mini-Mental Adjustment to Cancer (M-MAC), Brief Symptom Inventory (BSI)-18, Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), European Organization for Research and Treatment of Cancer QoL questionnaire instrument (EORTC QLQ-C30), SDM Questionnaire–Physician’s version (SDM-Q-Doc) y Satisfaction With Life Scale (SWLS).




Figura 1. Puntuaciones obtenidas por los pacientes en los cuestionarios pre y post quimioterapia adyuvante: BSI, M-MAC y EORTC-QLQ-C30.

Resultados:

El impacto del diagnóstico fue menos negativo entre los pacientes de edad avanzada, no existiendo diferencias en las estrategias de afrontamiento, la calidad de vida o la búsqueda de apoyo en ambos grupos. Con respecto a los cambios psicológicos desde el principio hasta el final del tratamiento adyuvante, ambos grupos informaron de más síntomas somáticos, incremento de la dificultad psicológica, reducción de las estrategias de afrontamiento, y decremento en la calidad de vida al final de la quimioterapia. Ver Figura 1.

Conclusiones:

Aunque hubo diferencias psicológicas entre adultos y pacientes con cáncer de edad avanzada, su evolución durante la quimioterapia adyuvante fue similar, con deterioro en ambos grupos en la calidad de vida y las estrategias de afrontamiento.