



## INTERPSIQUIS

Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología  
y Enfermería en Salud Mental

### **CARIPRAZINA EN EPISODIO DEPRESIVO CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS, A PROPÓSITO DE UN CASO**

<sup>1</sup>Luz María González Gualda , <sup>1</sup>Juan Del Águila Águila, <sup>2</sup>Araceli Martínez Carrascosa,  
<sup>1</sup>Carmen García Moreno, <sup>1</sup>Carolina Sánchez Cobos , <sup>1</sup>José Campos Moreno.

[lgonzalezgualda@icloud.com](mailto:lgonzalezgualda@icloud.com)

Cariprazina, Depresión. Episodio Psicótico

#### **RESUMEN**

La depresión es un problema común que a menudo se trata antidepresivos, sin embargo, muchos pacientes no mejoran con el tratamiento antidepresivo y presentan «depresión resistente al tratamiento» . Se pueden probar varios enfoques de tratamiento diferentes, como el aumento de la dosis del antidepresivo, el agregado de otro medicamento o terapia, o el cambio a un antidepresivo diferente.

Presentamos el caso de un varón de 46 años con diagnóstico de episodio depresivo con síntomas psicóticos que comienza tratamiento con cariprazina, un antidepresivo y terapia electroconvulsiva de forma progresiva debido a la falta de respuesta temprana con un solo tratamiento.

Realizamos una revisión de la literatura al respecto de esta patología y su tratamiento.

#### **INTRODUCCIÓN**

La cariprazina actúa como agonista parcial de los receptores de dopamina D2 y D3 con una alta afinidad por lo receptores D3. Se trata de un medicamento que vamos a usar para el episodio de depresión junto al trastorno psicótico. Para ver su eficacia se recomienda esperar de 4-6 semanas para determinar la eficacia del mismo.

## **CARIPRAZINA EN EPISODIO DEPRESIVO CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS, A PROPÓSITO DE UN CASO**

Cariprazina añade a la eficacia en sintomatología positiva una superioridad probada en sintomatología negativa, contribuyendo a la restauración del funcionamiento social y personal del paciente a través de un tratamiento completo de la esquizofrenia.

Gracias a su eficacia sobre los síntomas positivos en la fase aguda, previniendo las recaídas en la fase estable, y actuando sobre los síntomas negativos, puede tratar a los pacientes adultos con esquizofrenia durante todas las fases de la enfermedad.

Como efectos secundarios más frecuentes destacan: importante incidencia de acatisia, mínimo riesgo de hiperprolactinemia, no tiene efectos anticolinérgicos, no prolonga el intervalo QT cardíaco y tiene un perfil metabólico favorable. En los ensayos clínicos se apreciaron efectos oftalmológicos (como cataratas) cuyo significado no está claro.

### **OBJETIVO**

- Presentar una revisión de un caso clínico de un paciente diagnosticado de depresión en tratamiento con cariprazina.
- Revisar la literatura disponible sobre el uso de cariprazina en depresión.

### **MÉTODOS Y MATERIALES**

#### **Caso clínico**

Se ha empleado un caso clínico extraído del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, a través de una revisión retrospectiva de la historia clínica, además de utilizar los principales motores de búsqueda on-line.

### **RESULTADOS**

Nos ha parecido llamativa la mejora del paciente tras tres semanas con cariprazina a dosis máxima, coincidiendo con la tercera sesión de terapia electroconvulsiva y un antidepresivo añadido.

## **CARIPRAZINA EN EPISODIO DEPRESIVO CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS, A PROPÓSITO DE UN CASO**

### **CONCLUSIONES**

El tratamiento con cariprazina en la depresión en nuestro paciente en combinación con otros tratamientos le han proporcionado una estabilidad clínica de su diagnóstico de episodio depresivo con síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo. Coincidiendo con la literatura al respecto, los resultados sugieren que el tratamiento con cariprazina tiene utilidad en el tratamiento de la depresión y en los síntomas negativos de la esquizofrenia.

### **BIBLIOGRAFÍA**

1. Willie Earley, M.D. et al. Cariprazine Treatment of Bipolar Depression: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Phase 3 Study. *American Journal of Psychiatry*. 2019.
2. Davies P, Ijaz S, Williams CJ, Kessler D, Lewis G, Wiles N. Pharmacological interventions for treatment-resistant depression in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2019, Issue 12. Art. No.: CD010557. DOI: 10.1002/14651858.CD010557.pub2
3. Citrome L. Cariprazine for acute and maintenance treatment of adults with schizophrenia: an evidence-based review and place in therapy.
4. *Neuropsychiatr Dis Treat*, 2018. 14:2563-2577,
5. Ágai-Csongor E et al. Discovery of cariprazine (RGH-188): A novel antipsychotic acting on dopamine D3/D2 receptors. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*.2012. Volume 22, Issue 10, Pages 3437-3440
6. Papp M et al. Attenuation of anhedonia by cariprazine in the chronic mild stress model of depression. *Behav Pharmacol*. 2014 Sep;25(5-6):567-74.