

# Problemas diagnósticos en los trastornos

Mercedes Valverde Barea<sup>1</sup>, Francisca Cartas Moreno<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>FEA Psiquiatría. UHSM del Hospital Universitario de J  
San Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén <sup>3</sup>MIR Psiquiatría

## INTRODUCCIÓN

En la práctica clínica diaria solemos realizar aproximaciones diagnósticas en las primeras consultas, pero en ocasiones es más complicado, requiriendo un análisis más profundo de la enfermedad cuando la patología depresiva se mezcla con otros trastornos y los rasgos de personalidad.

## DESCRIPCIÓN

Mujer de 44 años. Antecedentes de hospitalización en unidad de psiquiatría en el contexto de síndrome depresivo. La paciente realiza seguimiento ambulatorio en primer plano el consumo de alcohol con características evasivas y múltiples tratamientos farmacológicos con escasa tolerancia, así como la dependencia alcohólica. Posteriormente, requiere nuevos ingresos donde se observa deterioro parcial, por lo que se realiza una tomografía computarizada craneal sin hallazgos. Intervenciones de tipo familiar para reducir la disfunción familiar y la aparición de rasgos de personalidad histeromórficos disfuncionales. Tratamientos programados. Tendencia a la confabulación y actitudes demostradas durante la hospitalización, presentando en el contexto hospitalario alteraciones de conducta.

## CONCLUSIONES

En ocasiones, una investigación detallada y un seguimiento estrecho tras el ingreso hospitalario nos puede llevar a realizar un adecuado diagnóstico y mejorar el manejo terapéutico que precisa la paciente y no solo que se siga la evolución del paciente.

### Referencias

Graham AV, Berolzheimer N, Burge S. Alcohol abuse. A family disease. *Prim Care*. Mar;20(1):121-30.

Fench JH, Shrestha S. Histrionic personality disorder. 2020 Oct 2. In: StatPearls