

Caso clínico: Meningioma y síntomas psiquiátricos

Crespo Amaro, D¹; Goitia Aritxa, B²; Vazquez Herrera, P¹; Pibernat Serrano, V²; Gómez Eguilaz, C¹; Álvarez Marrodan, I²

1. Medico Interno Residente Psiquiatria. Hospital San Pedro. Logroño.
2. FEA en Psiquiatria. Servicio Riojano de Salud.

INTRODUCCIÓN

El meningioma es el tumor benigno más común, representando el 13-26% de los tumores intracraneales. A menudo los síntomas neuropsiquiátricos pueden ser su única manifestación. Pueden presentar síntomas del estado de ánimo, psicosis, trastornos de la memoria, cambios de personalidad, ansiedad o anorexia nerviosa. Su detección cuando presentan principalmente síntomas psiquiátricos en un paciente que sufre de enfermedad psiquiátrica crónica a menudo está plagada de dilemas diagnósticos.

MATERIAL: CASO CLÍNICO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Varón de 60 años, quiosquero. Convive con su hermana. Sin hijos.

ANTECEDENTES

Seguimiento en USM desde 1994 por trastorno depresivo recurrente y dependencia a alcohol.

EVOLUCIÓN

23/02/2017

Describe tristeza, apatía, desesperanza, anhedonia, tendencia a la clinofilia, perdida de relaciones interpersonales, insomnio y "obsesiones".

23/03/2017

Manifiesta mejoría clínica con tratamiento antidepresivo. Más animado, activo y con planes futuros. Persiste insomnio.

26/04/2017

Eufórico y verborreico. Expresa haber abandonado el tratamiento. Impresiona consumo de alcohol.

23/05/2017

Eufórico, deshinibido, expansivo y logorreico. Refiere sensación de bienestar y de altas capacidades. Niega consumo de tóxicos. Plan: Se solicita RMN de cráneo.

RESONANCIA CEREBRAL:

Proceso expansivo compatible con gran meningioma frontoparietal derecho. Signos de microangiopatía. Pequeño foco isquemia lacunar en la región profunda del hemisferio cerebral izquierdo.

FALLECE EN JUNIO DE 2017 DURANTE INTERVENCIÓN DE MENINGIOMA

METODOLOGÍA

Se realiza una búsqueda bibliográfica sobre el tema en Pubmed, utilizando como palabras claves: psychiatric symptoms, meningioma y affective disorder.

RESULTADOS

Si el meningioma jugó o no un papel causal en el desarrollo de síntomas depresivos sigue siendo desconocido, sin embargo, este caso sugiere que puede haber una relación entre este tumor y el desarrollo de síntomas maníacos, añadiendo así evidencia de que los meningiomas podrían estar asociados con la sintomatología psiquiátrica.

El paciente presentó inicialmente síntomas depresivos, pero más tarde desarrolló algunos síntomas atípicos de difícil explicación. Estas características exigen nuevas investigaciones para descartar enfermedades orgánicas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es imperativo que los pacientes con síntomas psiquiátricos de nueva aparición, sintomatología atípica o falta de respuesta al manejo tradicional con psicofármacos sean examinados exhaustivamente para descartar una causa anatómica específica responsable de sus síntomas a fin de implementar la intervención, según sea necesario, en combinación con el tratamiento psiquiátrico.

1. Meningioma and psychiatric symptoms: An individual patient data analysis. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.03.029>.

2. Hussin S, Mohd Yusoff SS, Zin FM, Ghani AI. Frontal meningioma with psychiatric symptoms. J Family Med Prim Care 2018;7:252-4.