

# Síndrome Wernicke-Korsakoff: Caso clínico atípico y la importancia del diagnóstico precoz.

Del **Águila Águila, J.\***; Monferrer-Balaguer, M.\*; Campos-Moreno, J.\*; Fernández-Sotos, P.\*; Sánchez Mora, C.\*; González-Gualda, L.\*

\*Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete



XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Enfermería en Salud Mental

## INTRODUCCIÓN

### Encefalopatía de Wernicke:

- Resultado de la deficiencia de tiamina
- Significativa morbilidad y mortalidad.
- Triada clásica: oftalmoplejía, ataxia y confusión.
- Diagnóstico basado en la clínica
- Tratamiento: Tiamina IV + vitaminas B6 y B12 IV

### Demencia de Korsakoff:

- Manifestación neuropsiquiátrica tardía de la encefalopatía de Wernicke
- 80% de pacientes con encefalopatía de Wernicke sintomática lo presentan.
- Amnesia anterógrada y retrógrada inmediata. Apatía. Confabulaciones.
- No tratamiento efectivo. Los pacientes requieren de supervisión y apoyo social.

## MÉTODO

### Presentación del caso:

Paciente varón de 49 años. Antecedentes psiquiátricos de cuadro esquizofreniforme autolimitado hace 30 años sin seguimiento en la actualidad. Discapacidad intelectual leve. Escaso apoyo socioeconómico vive con sus padres añosos.

### Enfermedad actual:

Primera atención en Urgencias por cuadro confusional autolimitado

Dos meses después ...

Nueva atención por apatía y ánimo bajo

Un mes después Ingreso en UHB

## RESULTADOS

### Exploración del estado mental al ingreso:

Desorientación temporo-espacial. Inquietud psicomotriz, ecopraxias. Discurso desorganizado verbigerante, neologismos, ecolalias. Insomnio global.



Se inicia tratamiento con neuroléptico para control o conductual y Tiamina IV.

Se realiza PIC a MI, se solicitan pruebas complementarias y seguimiento.

Mejoría progresiva de descanso nocturno y la conducta.

Se revierte cuadro confusional, confabulaciones sin repercusión conductual. Necesidad de cuidados en ABVD.

Se tramita plaza en residencia.

## CONCLUSIONES

El diagnóstico temprano del síndrome de Wernicke-Korsakoff y la rápida instauración del tratamiento parenteral con Tiamina condicionará el pronóstico del paciente. Las formas subclínicas y las presentaciones atípicas de la enfermedad, así como otros factores, conllevan en ocasiones al infradiagnóstico de esta enfermedad.