

Influencia de la homofobia sutil y manifiesta en el uso del preservativo en hombres y mujeres heterosexuales



Vicente Morell-Mengual

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universitat de València. Estudi General





INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo un problema prioritario de salud pública. Para poder realizar intervenciones preventivas eficaces es preciso conocer que variables originan y mantienen las conductas sexuales de riesgo (Espada, Quiles y Méndez, 2003). Algunos estudios determinan que las actitudes homofóbicas como la creencia de que el SIDA es una epidemia asociada casi exclusivamente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres puede promover la adopción de conductas sexuales de riesgo por parte de las personas heterosexuales.

OBJETIVO Analizar el uso consistente o inconsistente del preservativo en el coito vaginal con parejas esporádicas en función del nivel de homofobia


METODOLOGÍA

La muestra estuvo compuesta por 120 hombres y 140 mujeres heterosexuales con edades comprendidas entre 17 y 45 años ($M = 26,38$; $DT = 6,74$). A todos los participantes se les administró la Escala de Homofobia Sutil y Manifiesta (Quiles, Betancor, Rodríguez, Rodríguez y Coello, 2003). Para ello se estableció contacto con diversas asociaciones y ONG españolas que publicaron, a través de sus páginas web y/o sus redes sociales (*Facebook* y/o *Twitter*), un enlace que remitía a los cuestionario *online*.




RESULTADOS

HOMOFOBIA MANIFIESTA



HOMOFOBIA SUTIL



CONCLUSIONES

Las personas que utilizan el preservativo consistentemente presentan menor nivel de homofobia manifiesta que las personas que utilizan el preservativo inconsistentemente, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en hombres pero no en mujeres. Por su parte, las personas que utilizan el preservativo consistentemente presentan menor nivel de homofobia sutil que las personas que utilizan el preservativo inconsistentemente, no siendo estas diferencias significativas ni en hombres ni en mujeres. Esta variable debe ser tenida en consideración en la elaboración de programas preventivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Quiles, M., Betancor, V., Rodríguez, R., Rodríguez, A. y Coello, E. (2003). La medida de la homofobia manifiesta y sutil. *Psicothema*, 15(2), 197-204.
- Espada Sánchez, J. P., Quiles Sebastián, M. J. y Méndez Carrillo, F. X. (2003). Conductas sexuales de riesgo y prevención del SIDA en la adolescencia. *Papeles del Psicólogo*, 24(85), 29-36.