



NÚMERO DE ATENCIONES, INGRESOS Y AÑOS DE EVOLUCIÓN QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL

Iciar Alonso García, Sara Pineda Murcia, Antonia M^a Soler Martínez, Luz M^a Giménez Giménez, Beatriz M^a Ruiz García, Carlos J. Sánchez Miñano, Karolina Rozmus, M^a del Mar Picón San Martín, Mateo Campillo Agustí y M^a Soledad Orenes Sánchez.
Hospital Morales Meseguer, Murcia (España)

1

OBJETIVOS

Analizar frecuencia de visitas, ingresos y años de evolución de pacientes con Trastorno Bipolar (TB) que acuden al Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Morales Meseguer (HMM) (Murcia).


MÉTODO

Tras selección de sujetos diagnosticados de TB atendidos en el SU del HMM durante el período de tiempo establecido (un año), se accedió a informes de alta de urgencias y se codificaron los datos de interés. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS, versión 15.0. La muestra consta de 63 sujetos: 44.4% varones y 55.6% mujeres. Rango de edad 20 - 82 años.

RESULTADOS


El 84.1% tienen diagnóstico TB I con 15.24 años de media de evolución. Respecto a atenciones en SU, un 62% presentan única atención, 63.2% de casos no ingresa, 28.1% ingresa una vez y 8.9% entre 2-5 veces. En relación al ingreso, la media de estancia es de 9 días; 40% de los pacientes no ha tenido ingresos previos, y 13-18% presenta 1-3 ingresos. El resto entre 10-26 ingresos.

NÚMERO DE INGRESOS EN UN AÑO DE LOS PACIENTES CON TB ATENDIDOS EN SU



● No ingresan
● 1 ingreso
● 2-3 ingresos

NÚMERO DE INGRESOS PREVIOS DE LOS PACIENTES CON TB ATENDIDOS EN SU EN UN AÑO



● Sin ingresos previos
● 1-3 ingresos
● 10-26 ingresos

CONCLUSIONES

Un porcentaje alto (85%) de pacientes que se atienden en el servicio de urgencias tienen diagnóstico de TB I. Más de la mitad son mujeres en la edad media de la vida. La mayoría llevan largo tiempo de evolución de la enfermedad. Más del 60% de casos acuden al servicio de urgencias una única vez y no precisan ingreso hospitalario. Los ingresos son breves (menos de 10 días) y en un 40% de pacientes se trata de su primer ingreso.