

INFLUENCIA DEL TDAH CON PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS COMÓRBIDAS ASOCIADAS



2017

I Congreso Virtual
Internacional de
Psicología

Ledesma Mena, María del Carmen / Torres Melgar, María / Kosaka Zanabria, Lenny Vanessa. (A.G.S. Campo de Gibraltar, Cádiz)

En la infancia, el TDAH (trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es una patología muy habitual

prevalencia del 6-8% en la población general

En la edad adulta, la presencia de trastornos psiquiátricos comórbidos (adicción a drogas) es una clínica muy usual del TDAH

presentándose en el 60-70% de los casos.

Palabras clave. TDAH, patologías psiquiátricas comórbidas

RESULTADOS

De los 43 diagnosticados de TLP y abuso de cocaína **25% mostraron criterios DSM (7 relacionados con TDAH comórbido).**


- 14'6% fueron varones
- 85'4% de mujeres

Edad media
34,6 años

METODOLOGÍA

Realizamos diagnóstico a pacientes asistidos a nuestro hospital durante enero-junio 2016, partiendo de una anamnesis detallada relacionada con posible existencia de patologías psiquiátricas comórbidas y con consumo de cocaína para estudiar la prevalencia del TDAH. Realizamos cuestionarios específicos (CONNERS, ADHD Y ASRS) por sospecha (en el momento actual y en la infancia) de sintomatología compatible con TDAH; también realizamos pruebas de personalidad (MCMI-III) y pruebas neuropsicológicas (STROOP, WAISIII, TMT, WCST, etc.).

PSICOPATOLOGÍAS ASOCIADAS



- Trastornos del control de impulsos
- Personalidad no especificados
- COCAÍNA
- Policonsumidores no especificados

CONCLUSIONES

Resaltamos la gran influencia del TDAH con patologías psiquiátricas asociadas. Nuestros estudios revelan alta prevalencia de TDAH en consumidores de drogas (psicoestimulantes-cocaína). Los patrones de consumo y la historia clínica toxicológica muestran características diferenciales con respecto a otros pacientes, con patrones marcados por intensa impulsividad y con inicios de consumo más precoz.