



Introducción

Desde el punto de vista epidemiológico, encontramos la creciente frecuencia de patología psiquiátrica producida por drogas que demanda cada vez más atención desde salud mental, existiendo un consumo creciente de sustancias conocidas como drogas ilegales (cannabis, opiáceos, anfetaminas) y aún más creciente, de alcohol que aunque siendo una sustancia legal, consumida de forma prolongada y a dosis altas puede precipitar el desarrollo de patología psiquiátrica importante.

Objetivos

Estudiar el perfil sociodemográfico más frecuente en una muestra de 52 pacientes con patología dual, en seguimiento en CSM

Material y Método

Se elaboró un protocolo de recogida de datos que incluyen edad, sexo, estado civil, nivel educativo, convivencia y situación laboral.


Resultados

En cuanto al sexo, en nuestra muestra solo 2 mujeres frente a 50 varones. Lo que indica un mayor porcentaje de estos en el consumo de sustancias
Referente al estado civil, el mayor porcentaje se refiere a los solteros (53,8%), seguido de los casados (36,5%).
En lo que concierne al estado de convivencia prevalece en un 48% de los casos, la convivencia con los padres.
Respecto a la situación laboral se encuentra mayores frecuencias de consumo entre los parados con un porcentaje del 60%
En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje corresponde a pacientes sin estudios (42,2%) y estudios primarios (38,5%)

estado civil




estudios



situación laboral



Convivencia



Conclusiones

El Perfil sociodemográfico más prevalente en nuestra muestra de pacientes resulta ser :

varón de 35 años de edad media, soltero, sin estudios, en situación laboral de paro y que mayoritariamente vive con sus padres