

Eficacia del palmitato de paliperidona ILP en la reducción del número de antipsicóticos orales de pacientes con trastorno de esquizofrenia



Ana Luisa Pérez Morenilla (USMC Cádiz, Hospital Universitario Puerta del Mar)



INTRODUCCIÓN


El palmitato de paliperidona es un agente bloqueante selectivo de los efectos de las monoaminas, cuyas propiedades farmacológicas son diferentes de los neurolépticos tradicionales. Palmitato de paliperidona ILP se une firmemente a los receptores serotoninérgicos 5-HT₂ y dopaminérgicos D₂. Está indicado para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos estabilizados. Este tratamiento es especialmente útil en pacientes graves, con baja conciencia de enfermedad y pobre adherencia al tratamiento. Se administra una vez al mes y ofrece un inicio de acción clínica rápido y eficaz desde la primera dosis.

OBJETIVOS

Nuestro estudio pretende evaluar el número de antipsicóticos utilizados antes y después de la introducción de palmitato de paliperidona ILP, para valorar de este modo la eficacia del tratamiento.

METODOLOGÍA

Para la elaboración de nuestro estudio hemos realizado una búsqueda en la base de datos del Sistema Andaluz de Salud (Diraya) de 42 pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia a los que se les había prescrito Palmitato de Paliperidona ILP, al menos dos meses antes de la realización del estudio. Se han comparado el número de antipsicóticos previamente y posterior a la introducción de paliperidona ILP (sin incluir dicho fármaco). Los datos se han obtenido manteniendo en todo momento la confidencialidad de los pacientes.



RESULTADOS

De los 42 pacientes, se observa que en 29 de ellos, el número de antipsicóticos utilizados después de la introducción de palmitato de paliperidona ILP disminuye. En 12 pacientes el número de antipsicóticos utilizados antes y después se mantiene, mientras que en 1 paciente aumenta. Dentro de los 29 pacientes con disminución del número de antipsicóticos, en 18 de ellos, el número de neurolépticos se redujo en dos o más.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra se evidencia que el número de fármacos neurolépticos que el paciente debe tomar diariamente se reduce con la administración de paliperidona ILP mensual.

Además, el palmitato de paliperidona mejora los síntomas actuales de la enfermedad, previene las recaídas y reduce el número de hospitalizaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- A.M. Nussbaum; T.S. Stroup Paliperidona palmitate for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012 Jun.
- Base de datos del Servicio Andaluz de Salud (DIRAYA)
- http://www.vademecum.es/medicamento-xeplion_ficha_38525
- <http://www.forumclinic.org/es>