



# INTERPSIQUIS 2022


XXIII CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL  
DE PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL

## TRASTORNOS DE MOVIMIENTO ASOCIADOS AL USO DE ANTIPSICÓTICOS EN SALA DE ESTANCIA PROLONGADA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA, ENERO-ABRIL 2022.

DR. NELSON ALEXANDER BETANCOURT VELASQUEZ .

NEUROLOGO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA.




# CONFLICTO DE INTERÉS

- Ninguno

# INTRODUCCIÓN

- Los síndromes tardíos son trastornos de movimiento causado por el uso crónico de medicamentos antipsicóticos, que causan discapacidad y deterioro en la calidad de vida de los pacientes.



• Los síndromes tardíos (TS) representan un grupo de trastornos del movimiento que incluyen

1. Estereotipia
2. Distonía
3. Corea
4. Acatisia
5. Mioclono
6. Tics
7. Parkinsonismo
8. Trastornos de la marcha
9. Desviaciones oculares
10. Disquinesia respiratoria
11. Variedad de síntomas sensoriales

## OBJETIVO

- El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de síndromes tardíos en los pacientes de internamiento prolongado.

No existen datos locales sobre la prevalencia de síndromes tardíos.

# METODOLOGÍA


- Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el periodo de Enero a Abril del 2022 en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, con un universo de 108 pacientes en sala de internamiento crónico, fueron seleccionados 91 pacientes que cumplían con criterios de inclusión
- Se realizó una revisión del expediente clínico y una evaluación física donde se aplicó la Escala de Movimientos Anormales Involuntarios (AIMS) para determinar la presencia de síndromes tardíos.

# RESULTADO

## Características sociodemograficas.


|  |          |
|--|----------|
| <b>Promedio de edad</b>                    | 49 años  |
| <b>Sexo masculino</b>                      | 58% (53) |
| <b>Sexo femenino</b>                       | 42% (38) |
| <b>Promedio de años de hospitalización</b> | 14 años  |

## Prevalencia de Síndrome tardío




■ sin síndrome tardío ■ con síndrome tardío


## Síndromes tardíos mas frecuentes



Prevalencia de Síndrome tardío según Sexo




Prevalencia de Síndrome tardío según edad




prevalencia de Síndrome tardío según generación de antipsicótico



Prevalencia de Síndrome Tardío según tiempo de exposición al antipsicótico



Prevalencia de síndrome tardío según número de antipsicóticos utilizados



Antipsicóticos de segunda generación asociados a síndrome tardío



## CONCLUSIÓN.

- Existe una alta prevalencia de síndromes tardíos en los pacientes de internamiento prolongado del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Los factores que se asociaron mas al desarrollo de síndromes tardíos fueron la edad, el sexo, el tiempo de exposición a antipsicóticos, el numero y el tipo de antipsicóticos utilizados.