

# HOMOSEXUALIDAD Y DROGAS. FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURAL, COMPARATIVA ENTRE POBLACIÓN LGB Y HETEROSEXUAL Y PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CONSUMO



B. Rodríguez<sup>1</sup>, M. Mahillo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>.Red de Salud Mental de Bizkaia. Spain

## INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS

El tratamiento contra las drogodependencias es motivo de estudio desde hace décadas. A través de distintas áreas como la psicología, la psiquiatría, la farmacología o la enfermería se están consiguiendo tratamientos cada vez más efectivos en la lucha contra las adicciones. Los estudios epidemiológicos que tratan de buscar los eslabones sociales más tendentes al consumo, suelen en ocasiones obviar al colectivo LGB como un eslabón más débil o susceptible. En esta investigación se revisan las causas o motivos que llevan a este sector de la población a consumir en mayor medida que la población heterosexual; así como comparativas de consumo entre población LGB y heterosexual.

## METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión bibliográfica y una encuesta con una muestra n=31.

## RESULTADOS

El 87% de los encuestados considera el consumo de drogas una problemática de la sociedad actual. No se considera que la población LGB sea más susceptible a pesar de que entre los encuestados gays y bisexuales las opiniones están divididas. Los factores precipitantes en el consumo de drogas serían la exclusión, los prejuicios, la marginalidad. El uso recreacional relacionado con el sexual es uno de los motivos más expresados por los cuales el colectivo LGB hace uso de los tóxicos siendo los estimulantes los de mayor uso y extensión.



## CONCLUSIONES

Se desprende de los resultados obtenidos una preocupación por el consumo de drogas y por su normalización. No obstante, sólo un pequeño porcentaje de los encuestados consideran al colectivo LGB más vulnerable. Esto podría traducirse en la invisibilidad del colectivo o en un intento de normalizarlos y equipararlos a todos los efectos con la población heterosexual, presuponiéndoles los mismos riesgos que a la misma. Se hace evidente la necesidad de seguir investigando entorno a la vulnerabilidad del colectivo de cara a futuros tratamientos. Individualizándolos y aumentando su especificidad podremos ofertar unos cuidados acordes a las necesidades de los pacientes. Además, realizando políticas de prevención a colectivos específicos podrían evitarse diversas problemáticas asociadas al consumo de drogas.