

Evaluar la dosis media de paliperidona en pacientes ambulatorios para su estabilización clínica.

Martí Garnica, M.V., Ortega García; M.D., Lorente Murcia, A., Rodríguez Hernández, A., Pacheco Serrate, J, Blaya Sánchez, Y., Ortuño Campillo, T., Bravo Gómez, S., Bello Pombo, I.

INTRODUCCIÓN

Evaluar la dosis media de paliperidona en pacientes ambulatorios para su estabilización clínica.

MÉTODO

Se analiza una muestra de 67 pacientes, 25 mujeres y 42 hombres diagnosticado de Esquizofrenia, Trastorno esquizoafectivo, Trastorno delirante crónico, Trastorno bipolar, Trastorno de la personalidad, Retraso mental, Trastorno generalizado del desarrollo y Trastorno obsesivo-compulsivo. Se analizó en nuestra muestra de pacientes más de la mitad (55.2%) padecen Esquizofrenia y hemos observado que con el empleo de paliperidona de liberación prolongada una estabilización a nivel de síntomas y una mejor adherencia al tratamiento, así como en los demás trastornos. Aunque, se necesita un mayor número de pacientes para ver el comportamiento de la dosis media de este tratamiento.

an la dosis media de paliperidona de liberación prolongada para alcanzar la estabilización clínica en un periodo de 12 meses de tratamiento.

RESULTADOS

La dosis media para la Esquizofrenia es de 123,64mg, para el Trastorno Esquizoafectivo es de 225mg, para el Trastorno delirante crónico es de 100mg, para el Trastorno bipolar es de 66,6mg, para el Trastorno de personalidad es de 162,5mg, para el Retraso mental es de 100mg, para el Trastorno generalizado del desarrollo es 112,5mg y por último para el Trastorno obsesivo compulsivo es de 32,5mg.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra de pacientes más de la mitad (55.2%) padecen Esquizofrenia y hemos observado que con el empleo de paliperidona de liberación prolongada una estabilización a nivel de síntomas y una mejor adherencia al tratamiento, así como en los demás trastornos. Aunque, se necesita un mayor número de pacientes para ver el comportamiento de la dosis media de este tratamiento.