

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y PATOLOGÍA DUAL

Raposo Hernández MR¹, Murcia Liarte JB¹, Bello Pombo I¹, Bravo Gómez S¹, Blaya Sánchez Y¹, Ortuño Campillo T¹.
¹. Área de Salud Mental de Cartagena. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción

★ Los estudios han mostrado elevadas tasas de comorbilidad entre los trastornos de personalidad y los trastornos por uso de sustancias. La presencia concomitante de un Trastorno de Personalidad tiene implicaciones en la clínica, el pronóstico y los tratamientos del trastorno por uso de sustancias. La presencia de trastorno comórbido se relaciona con una peor respuesta y peor pronóstico del trastorno por uso de sustancias, así como con una elevada tasa de abandonos prematuros de los programas de tratamiento.

Objetivos



- ★ - Analizar el diagnóstico psiquiátrico más frecuente en una muestra de pacientes con patología dual
- ★ - Estudiar la comorbilidad entre los trastornos de personalidad y los trastornos por uso de sustancias.

Material y Método

- ★ El estudio se realiza sobre una muestra de 52 pacientes con patología dual y con consumo de sustancias que realizan seguimiento en Centro de Salud Mental

Resultados

★ El primer diagnóstico es el de Trastorno de la Personalidad con 22 pacientes (42%). En segundo lugar el trastorno Esquizofrénico con 12 pacientes (23%). El resto de los diagnósticos: T. Bipolar con 6 pacientes (11%), T. Esquizoafectivo, con 3 pacientes (6%), al igual que T. Adaptativo, 3 pacientes (6%), T. Esquizotípico 2 pacientes (4%). T. Control impulsos: 4 pacientes (8%)
Del conjunto de los trastornos de personalidad, sobresale con mayor puntuación el trastorno antisocial (69%), aunque con puntuación media muy similar al trastorno límite (63,77%) y al trastorno paranoide (68,37%)



Conclusiones

La patología psiquiátrica más frecuentemente asociada con el consumo de sustancias, en pacientes con patología dual, son los Trastornos de Personalidad, seguido del Trastorno Esquizofrénico. El resto de los diagnósticos psiquiátricos ocupan un porcentaje inferior al 11%. El trastorno de la personalidad es un factor premórbido y predisponente al consumo de sustancias. Rasgos como la impulsividad, el aislamiento o el bajo estado de ánimo facilitarían el uso de éstas, siendo las más frecuentes el alcohol, cocaína y sedantes
-Los Trastornos Antisocial, Límite y Paranoide de personalidad son los más frecuentemente asociados al consumo de sustancias.