

ESTUDIO DEL TRASTORNO BIPOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. EXPLOTACION DE DATOS CIE 10



Cristina Fernández Díez de los Ríos (Hospital Materno Infantil de Málaga)
María Victoria Jurado Lucena (Hospital Virgen de las Nieves de Granada)
Inmaculada Orihuela González (AGS Sur de Granada)

INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar (TB) es una afección en la cual una persona tiene períodos de depresión en los que está extremadamente feliz o malhumorado o irritable. Cuanto más pequeño es el niño, mayores son las dificultades de llegar a un diagnóstico correcto. Nuestro objetivo es conocer su incidencia, tratamiento y efectos secundarios.




METODOLOGÍA

Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes con edades entre 8 y 16 años, tratados en un Servicio de Salud Mental durante el período 2010-2015. Las variables utilizadas han sido síntomas, edad, sexo y medicación. Las fuentes de información han sido el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) y la historia clínica a través de los diagnósticos CIE 10.



MEDICAMENTOS



RESULTADOS

Se han obtenido un total de 49 casos:

♀ 27 mujeres

♂ 22 hombres

Antecedentes de TB: 58%

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Aumento de peso: 73%
- Sedación: 56%
- Temblor de manos: 43%
- Nistagmo: 41%
- Náuseas: 39%
- Dolor de cabeza: 32%

CONCLUSIONES

1. No hay datos significativos de mayor incidencia por sexo.
2. La medicación más habitual es el litio.
3. Esta afección aumenta en pacientes con antecedentes familiares de TB.
4. Estos síntomas no tienen por qué darse todos en el mismo niño.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Trastornos bipolares. E. Vieta, C. GastÚ. Springer-Verlag IbÈrica 1997
- ❖ La enfermedad de las emociones. El trastorno bipolar . E. Vieta. F. Colom, A. Martínez-Ar·n. Columna Edicions 1999