

EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES PSICOSOCIALES VS TRATAMIENTO HABITUAL EN PACIENTES ESQUIZOFRENICOS.



Martínez Román, Ana; Martínez Román, Marta y Comino Nieto, Rocío.

INTRODUCCION

España posee una prevalencia de un 0,9% de esquizofrenia, de los cuales existe una mayor incidencia en hombres. Dicha enfermedad se desarrolla en los hombres entre 15-30 años y en mujeres entre los 25-35. El tratamiento farmacológico es una base fundamental en la esquizofrenia junto a las intervenciones psicosociales, hoy en día la tasa de adherencia al tratamiento es de un 41,2%. Nuestro objetivo es demostrar la eficacia de las intervenciones psicosociales conjunta al tratamiento farmacológica frente al tratamiento farmacológico.


METODOLOGIA

119
PACIENTES

Grupo 1
(51paciente). Tto
antipsicóticos

Grupo 2 (68 pacientes)
Tto antipsicótico +
intervenciones
psicosociales (manejo de
medicación, síntomas,
relaciones sociales y
familiares)

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Con dicho estudios se demuestra que las intervenciones psicosociales unidas al tratamiento farmacológico son fundamentales para conseguir la adherencia al tratamiento, que es un punto de vital importancia para tener una buena reinserción social, prevención de recaídas y re-hospitalizaciones, control de síntomas etc.

BIBLIOGRAFIA

1.- Valencia M, Fresan A, Juárez F, Escamilla R, Saracco R. The beneficial effects of combining pharmacological and psychosocial treatment on remission and functional outcome in outpatients with schizophrenia. J Psychiatr Res. 2013 23 Dec;47(12):1886-92. [citado el 15 My 2015]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24112947>

2. <https://addi.ehu.es/bitstream/10810/16033/2/TFG%20Adherencia%20al%20tratamiento%20en%20la%20esquizofrenia.pdf>

PALABRAS CLAVES: Esquizofrenia (schizophrenia), adherencia (adherence) y tratamiento psicosocial (psychosocial treatment).