

IMPACTO DE LAS DROGAS EN LA ESQUIZOFRENIA. CÓDIGOS CIE-10

Autores: Inmaculada Bellamy García. Técnico en Documentación Sanitaria Hospital Puerta del Mar, Cádiz; María Dolores Urquizar Sierra, Técnico en Documentación Sanitaria Complejo Hospitalario de Granada; Antonio Vega Álvarez. Técnico en Documentación Sanitaria Hospital Infanta Margarita de Cabra, Córdoba.



INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas produce una agudización de los trastornos mentales. Nuestro objetivo es conocer la relación e incidencia entre consumo de drogas y esquizofrenia, eficacia de los tratamientos clínicos y su relación con aspectos sociodemográficos.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo retrospectivo de una muestra de 80 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Las variables: Edad, sexo, cumplimiento tratamiento y variables sociodemográficas. Las fuentes de información han sido la historia clínica y la confección de tablas Excel para estudios estadísticos.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

1. Hemos observado una mejoría significativa de la enfermedad en pacientes cumplidores del tratamiento
2. El cannabis es un factor de riesgo en el desarrollo de la esquizofrenia
3. Hay un mayor consumo de drogas en hombres
4. Factores como el entorno social familiar y socioeconómico son determinantes en el consumo de estas drogas

Referencias bibliográficas

- STAHL S. Psicofarmacología esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ariel Neurociencia, 2002.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (IV). Texto revisado. Barcelona: Masson-Salvat, 2001.
- LIEBERMAN JA, STROUP TS, McEVOY JP, SWARTZ MS, DAVID SM, ROSSENHECK RA, ET AL. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med. 2005; 353: 209-23.