

MEMORIA EXPLÍCITA E IMPLÍCITA EN TRES GRUPOS: ESQUIZOFRENIA REFRACTARIA, DEPRESIÓN MODERADA, GRUPO CONTROL

**AUTORES: JUAN JOSÉ PÉREZ MORENO *; MANUEL ROMERO GARCÍA;
ALMUDENA SALAZAR GÁMEZ.**

* HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA-SANTIAGO (VITORIA)

INTRODUCCIÓN

Clasificamos la memoria explícita, voluntaria; mientras que la memoria implícita no requiere la recuperación intencional. Muchas personas con esquizofrenia presentan un pronunciado déficit de la memoria, encontrándose también perjudicada en sujetos depresivos.
Objetivos: Estudio de la memoria explícita e implícita en tres grupos de participantes: Esquizofrenia refractaria, Depresión moderada, Controles.

METODOLOGÍA

Estudio piloto (N=30) descriptivo-transversal con tres grupos: Esquizofrenia refractaria (n=10), Depresión moderada (n=10), Control (n=10).
Pruebas utilizadas: Prueba de completión de raíces de palabras. (memoria implícita), Prueba de recuerdo señalado de raíces de palabras (memoria explícita), Cuestionario GHQ-28 (inclusión en grupo control).

*RESULTADOS

A* Esquizofrenia refractaria
B* Depresión moderada
C* Controles

Aciertos	Falsas alarmas	Aciertos-Falsas alarmas	Proporción media (desviación típica)	Raíces; palabras estudiadas	Raíces; palabras no estudiadas	Priming	T-Student (p<0,05)
A* 0,24 (0,05)	A* 0,20 (0,05)	A* 0,04 (0,02)		A* 0,31 (0,04)	A* 0,09 (0,08)	A* 0,22 (0,10)	A*0,000697661
B* 0,23 (0,05)	B* 0,19 (0,05)	B* 0,04 (0,02)		B* 0,28 (0,17)	B* 0,12 (0,12)	B* 0,16 (0,05)	B*0,022329722
C* 0,37 (0,16)	C* 0,13 (0,07)	C* 0,23 (0,17)		C* 0,45 (0,10)	C* 0,14 (0,05)	C* 0,29 (0,12)	C*0,00000084965

CONCLUSIONES

- Tanto los participantes con Esquizofrenia Refractaria como los participantes con Depresión moderada presentan puntuaciones medias similares en memoria explícita.
- La memoria implícita se mantiene estable en las tres muestras.
- Los participantes del grupo control presentaron puntuaciones medias mayores en memoria explícita respecto a las muestras de Esquizofrenia Refractaria y Depresión Moderada.
- Los resultados de las pruebas implícitas en el grupo "Depresión Moderada" dependen del tipo de prueba. En la prueba de "compleción de raíces de palabras no se apreciaron diferencias; si hubiéramos utilizado la prueba de producción de ejemplares de categorías la facilitación debida al estudio previo sería mayor en los controles que en los depresivos.
- Para extrapolar los resultados, a la necesidad de aumentar el tamaño de la muestra, se añade la pertinente utilización tanto de pruebas perceptuales como conceptuales.

BIBLIOGRAFÍA

- (1): Redondo MT, Reales JM, Ballesteros S. Memoria implícita y explícita en mayores no dementes con trastornos metabólicos producidos por la diabetes mellitus tipo 2. *Psicológica*. 2010; 31:87-108.
- (2): Czepielewski LS, Massuda R, Goi P, Sulzbach-Vianna M, Reckziegel R, Costanzi M, Kapczynski F, Rosa AR, Gama CS. Verbal episodic memory along the course of schizophrenia and bipolar disorder: A new perspective. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2014 Sept; 16.